

予防接種スケジュール表

(表中の接種間隔は標準的な間隔です)

接種する年齢(法で決められた期間)
望ましい接種時期

0歳 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 7歳6ヶ月 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳

不活化ワクチン	小児肺炎球菌	定期	<p>○接種開始が生後2か月～7か月未満 4回接種：初回接種 27日以上の間隔をあけて3回接種（1歳までに接種する） 追加接種 3回目接種後60日以上あけて1歳～1歳3か月の間に1回接種</p> <p>○接種開始が生後7か月～12か月未満 3回接種：初回接種 27日以上の間隔をあけて2回接種（1歳までに接種する） 追加接種 2回目接種後から60日以上あけて1歳を過ぎて接種</p> <p>○接種開始が1歳～2歳未満2回接種：60日間以上の間隔をあけて2回接種</p> <p>○接種開始が2歳～5歳未満1回接種：1回接種のみ</p>
不活化ワクチン	B型肝炎	定期	<p>27日以上の間隔をあけて2回接種</p> <p>↑3回目 1回目から139日(20週)以上の間隔をあけて接種</p>
生ワクチン	ロタウイルス	定期	<p>ロタリックス</p> <p>27日以上の間隔をあけて2回接種</p> <p>初回接種は出生14週6日後までに接種</p> <p>ロタテック</p> <p>27日以上の間隔をあけて3回接種</p> <p>初回接種は出生14週6日後までに接種</p>
不活化ワクチン	5種混合 2種混合	定期	<p>1期 初回3回・追加1回(4種混合 ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ) 初回接種 20日～56日までの間隔をおいて3回接種</p> <p>2期1回(2種混合 ジフテリア・破傷風)</p> <p>↑追加接種 初回3回目接種後6か月～18か月の間に1回接種</p>
生ワクチン	BCG	定期	
生ワクチン	水痘	定期	<p>1回目 生後12か月～15か月の間に接種</p> <p>2回接種</p> <p>↑2回目 1回目接種後6か月～12か月の間に接種</p>
生ワクチン	MR (麻疹 風疹混合)	定期	<p>1期(1歳になったら早めに1回接種する)</p> <p>2期小学校入学前の1年間(年長組にあたる年の4月1日～3月31日の間で1回接種する)</p>
不活化ワクチン	日本脳炎	定期	<p>1期 初回2回・追加1回</p> <p>初回接種 6日～28日までの間隔をおいて2回接種</p> <p>2期 1回接種</p> <p>↑追加接種 初回2回目接種後おおむね1年後に1回接種</p>
不活化ワクチン	HPV ワクチン (女子のみ)	定期	<p>サーバリックス</p> <p>1月の間隔をあけて2回目接種</p> <p>1回目から6月の間隔をあけて3回目接種</p> <p>2月の間隔をあけて2回目接種</p> <p>小学校6年生から高校1年生の間に接種をする</p> <p>シルガード</p> <p>1回目から6月の間隔をあけて3回目接種</p> <p>○シルガードを使用したときに、1回目接種を15歳になるまでに受けた場合は、</p>

定期 定められ期間内で受ける場合は原則として無料(公費負担)